Trombose arterial espontânea em recém-nascido

Dra. Marília Pereira – R3 de Pediatria (HUAP/UFF)
Dr. Leonardo Campos – Reumatologista Pediátrico (HUAP/UFF)

Relato de Caso

Letícia, feminina, 29 anos,

Palpitações, tremores e sudorese que iniciaram após sua primeira gestação.

Dor abdominal crônica

Relato de Caso

Em 2019 durante investigação – TC de abdômen: *“Massa heterogênea, com áreas hipodensas e calcificações de permeio, medindo cerca de 9,3 x 7,6 x 7,2 cm na topografia da adrenal esquerda.”*

Encaminhada ao INCA - primeira consulta em março/23

Novo exame de imagem: *“Formação expansiva heterogênea com calcificações no interior e periféricas, medindo cerca de 7,6 x 6,7 cm localizada na retrocavidade dos epiplons e no retroperitônio, à esquerda.”*

Relato de Caso

Diagnóstico: **Feocromocitoma/paraganglioma**

- Ácido vanilmandélico = **66** (VR: até 6,6)
- Catecolaminas plasmáticas:
 - Dopamina = **321,4** (VR: até 85)
 - Epinefrina = 15 (VR: até 84)
 - Norepinefrina = 30 (VR: até 420)
- Metanefrinas urinárias:
 - Noradrenalina = **297,11** (VR: até 97)
 - Adrenalina = 3 (VR: até 27).

Relato de Caso

Programado ressecção cirúrgica -> gestação -> Doxasozina

G3P2A0

Uma cesárea há 7 anos por descontrole pressórico
um parto vaginal há 2 anos sem intercorrências.

Gestação atual:

Realizou > 10 consultas de pré-natal

Diabetes gestacional, com
glicemias controladas sem
insulinoterapia

Sorologias gestacionais e
TORCHS sem alterações

Durante a gestação: RNM: *“Massa heterogênea com efeito expansivo, medindo 19,4 x 5,9 x 9,5 cm, localizada no retroperitônio entre o hilo renal esquerdo e a aorta. A lesão apresenta centro liquefeito com hipossinal em T1 e hipersinal em T2, tem contato com a aorta, tronco celíaco e artéria esplênica (com diâmetro preservado), comprime extrinsecamente a artéria mesentérica superior, artéria renal esquerda (deslocada posteriormente), as quais tem calibre e fluxo preservado. A massa também comprime o rim esquerdo no seu eixo anteroposterior. **Sugestivo de paraganglioma retroperitoneal para-aórtico à esquerda.**”*

Foi programada cesárea para interrupção do parto devido ao descontrole pressórico materno, resultando em recém nascida a termo, feminina, Apgar 9/9, com bolsa rota no ato, sem manobras de reanimação neonatal necessárias.

Com poucas horas de vida, apresentou importante **palidez no membro inferior esquerdo, apesar de tentativas iniciais de aquecimento do mesmo, evoluindo com pulso de difícil caracterização.**

Hipótese diagnóstica

RN a termo, parto cesáreo
por descontrole pressórico
materno (paraganglioma)

Parto sem
complicações

Membro inferior esquerdo
pálido, com
pulso débil

TROMBOSE ARTERIAL ESPONTÂNEA

Trombose no recém-nascido

- População geral: 0,05 casos/1.000 nascidos vivos
- 2,4 casos/ 1000 admissões em UTI neonatal
- RN tem maior risco que demais crianças -> alterações circulatórias e imaturidade

hemostasia

TROMBOSE NO RECÉM-NASCIDO

Arterial

Venosa

Trombose Venosa

Tríade de Virchow

Estase

Lesão endotelial

Hipercoagulabilidade

Trombose Arterial

- Iatrogênica (maior parte dos casos)
- Afetam principalmente a aorta, ilíacas e femorais
- Eventualmente associada à trombofilias
- Cateterismo umbilical: 23% dos pacientes possuem trombose - maioria assintomática

Etiologias/fatores de risco

MATERNOS

- Parto cesáreo
- Diabetes
- Obesidade
- Pré-eclâmpsia
- Oligodraminia
- Idade materna avançada
- Hipertensão
- Lúpus
- Parto prolongado
- Diminuição dos movimentos fetais intraútero

PRÓ-TROMBÓTICOS

- Trombofilias hereditárias

CONGÊNITOS

- Sofrimento fetal
- Idade Gestacional
- CIUR
- PCA
- Alterações do cordão umbilical
- Alterações placentárias
- Disfunção cardíaca/Cardiopatias congênicas
- Vasoespasmo intenso uterino ou neonatal

ADQUIRIDOS

- Asfixia/hipóxia neonatal
- Aspiração meconial
- Cateterismo
- Corioamnite
- Sepses neonatal

Diante do exposto...

- Qual seria a sua conduta no momento?
- Qual investigação deve ser realizada?

Conduta

1. Definição da trombose e sua localização:

US com Doppler arterial de membros inferiores

*“Artéria femoral comum/origem da artéria femoral superficial de calibre preservado, **contendo pequeno segmento com trombo ecogênico, não compressível e sem fluxo de permeio, compatível com trombose.** Restante da artéria femoral superficial sem sinais de trombo ecogênico em seu interior, compressível, sem fluxo caracterizado ao Doppler. Artéria femoral profunda de difícil caracterização“*

Conduta

2. Definição do tratamento

Cirúrgico

Parecer da Cirurgia Vascular

Arteriotomia + embolectomia com Fogarty-
arteriorrafia

(dificuldade de realização)

Clínico

- Aquecimento do membro
- Anticoagulação com heparina não fracionada (28 U/kg/h)

3. Definição etiológica da trombose

FATORES DE RISCO POSSÍVEIS

Congênitos

Maternos

Pró-trombóticos

Hereditários
(AT, ptn C e S)

Análise histopatológica
da placenta

Adquiridos
(SAF neonatal)
Origem
cardioembólica
(ECG e ECOTT)

Anatômicos
(AngioTC de crânio, tórax,
abdome e MMII)

- História materna (DM e HAS)
- Trombofilia?

Resultados dos exames iniciais

	20/12/23	21/12/23	23/12/23	24/12/23
Hm	5,04	4,06		
Hb	17,3	14		
Ht	51,7	41,3		
VCM	102,6	101,8		
CHCM	33,5	33,9		
RDW	17,6	17,1		
Plqt	301.000	282.000		
Leuco	22.900 (0/1/0/0/6/7 5/12/6)	23.600 (0/0/0/0/0/6 4/27/9)		
Na	139			
K	6,8			
Ca	9,3			
TAP	12,6		11,8	
INR	1,18		1,1	
PTT	35,5			33,1
Coombs direto	negativo			

Fatores Pró-trombóticos

- **SAF neonatal:**
 - Anticoagulante lúpico (RN): negativo
- **Pesquisa de SAF materno:**
 - Anticoagulante lúpico: negativo
 - Anticardiolipina IgM e IgG: negativo
 - Anti beta2 glicoptn1: IgM e IgG negativo
- **Trombofilias hereditárias**
 - Proteína C materna: 125% (VR: 40-140%) | Proteína S materna: 50% (VR: 64,7-115,3)
 - Antitrombina III materna: 107,9% (VR: 79-112%)

Fatores Pró-trombóticos

- **Ecocardiograma:**

Objetivo: Pesquisar alterações estruturais (apêndice atrial) que favoreçam formação de trombos

Ecocardiograma: Forame oval patente amplo, sem outras alterações

- **ELETROCARDIOGRAMA**

Objetivo: Descartar arritmias relacionadas ao quadro materno ou ao RN

ECG: Sem alterações

- **Angiotomografia** (crânio, tórax, abdômen e membros inferiores)

Objetivo: Descartar alterações anatômicas e outros sítios acometidos

AngioTC: Sem alterações

No caso clínico relatado...

Trombose Arterial Espontânea

Trombose Arterial Espontânea

- **Parto sem fatores de risco e sem complicações**, sem restrição de crescimento em US fetal – trombose arterial de manifestação “quase impossível”
- **Confundido com fenômeno de Arlequim atípico**
- **Não há predisposição genética para trombofilias**

Fenômeno de
Arlequim

Trombose Arterial Espontânea

- O período neonatal possui maior risco de tromboembolismo, mesmo sem fatores de risco
- Trombose arterial é melhor documentada na presença de predisposição genética, transtorno subjacente ou gatilhos adquiridos (sepse, doença cardíaca congênita, medicamentos, cateterismo) → **casos espontâneos são raros e de difícil descrição**

Fatores de risco do pacientes

MATERNOS

- **Parto cesáreo**
- **Diabetes**
- Obesidade
- Pré-eclâmpsia
- Oligodraminia
- Idade materna avançada
- **Hipertensão**
- Lúpus
- Parto prolongado
- Diminuição dos movimentos fetais intraútero

PRÓ-TROMBÓTICOS

- Trombofilias hereditárias

CONGÊNITOS

- Sofrimento fetal
- Idade Gestacional
- CIUR
- PCA
- Alterações do cordão umbilical
- Alterações placentárias
- Disfunção cardíaca/Cardiopatas congêntas
- **Vasoespasm intenso uterino ou neonatal**

ADQUIRIDOS

- Asfixia/hipóxia neonatal
- Aspiração meconial
- Cateterismo
- Corioamnite
- Sepses neonatal

Tratamento

Objetivo: prevenir novas trombooses, evitar complicações a longo prazo e minimizar risco de sangramentos

Atenção a bebês com alguma patologia (de base ou adquiridas) e muito baixo peso e/ou em sua primeira semana de vida, pelo maior risco de sangramento

- **Heparina** (não fracionada, baixo peso molecular) é **TRATAMENTO DE ESCOLHA**

Doses usualmente mais altas que em adultos (bem toleradas)

- **Ativador de plasminogênio tecidual** (pouca experiência)
- **Uroquinase / estreptoquinase:** efetivo em população neonatal?
menos documentação
- **Abordagem cirúrgica:** recorrência de vasoespasmos em RNs

Técnicas microcirúrgicas parecem melhorar resultados (expertise?)

No caso clínico relatado...

- Após D7 de uso de **heparina não fracionada**, houve **resolução da trombose** (membro com perfusão normal, sem sinais de isquemia periférica), **sendo realizada troca para enoxaparina 1,5 mg/kg/dose**, de 12/12h, com controle laboratorial com dosagem de fator Xa (após 3ª dose de enoxaparina)
- Paciente apresentou **boa evolução, sem novos episódios trombóticos**
- **Novo Doppler após tratamento sem trombos** (10/01/24)
- Seguiu **acompanhamento ambulatorial, com resolução completa do quadro.**

No caso clínico relatado...

Algoritmo

Sistema Nervoso Central

Sinais clínicos: convulsões (focais ou), alteração de sensório, paralisias e paresias generalizadas

Imagem: US doppler vasos cerebrais e esplâncnicos, RNM/AngioRNM, ecocardiograma

Testes no sangue: hematócrito, contagem de plaquetas, avaliação pro-trombótica, avaliar exames nos pais (anti-trobina, ptn C e S, lipoproteína, homocisteína, fator V de Leiden, mutação fato IIG20210A da protrombina, anticorpo anticardiolipina, e anticoagulante lúpico materno)

Manejo:
Referenciar ao especialista para avaliação
a) primeiro episódio sem evidencia de fonte embólica – suporte
b) evidência de fonte embólica ou recorrência: anticoagulação com heparina (BPM ou NF)

Periferia

Sinais clínicos: frieza, palidez, diminuição de perfusão de extremidades, pouca/ausência de pulsos locais. Paresia da extremidade afetada, dor, irritabilidade. Hipóxia/acidose metabólica repentina

Imagem: US doppler vasos afetados e vasos esplâncnicos, ecocardiograma

Testes no sangue: mesmas investigações para o SNC.

Manejo:

Encaminhar ao especialista

a) anticoagulação para trombo oclusivo com heparina NF (BPM se não houver procedimentos invasivos ou se planejamento de terapia trombolítica)

b) Terapia trombolítica Tpa se não resposta a heparina ou isquemia tecidual progressiva

c) Anticoagulação com HNF se progressão da fonte embólica na presença de trombo arterial não progressivo

d) Referenciar à cirurgia se evidência de síndrome compartimental ou gangrena para avaliação de isquemia potencial

e) Terapia hiperbárica em bebês a termo com viabilidade tecidual limítrofe após trombo oclusivo (experimental)

Referências

NEONATAL thrombosis: Clinical features and diagnosis. [S. l.], 2 out. 2023. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/neonatal-thrombosis-clinical-features-and-diagnosis?search=heparin%20adjust%20neonatal&topicRef=5911&source=related_link. Acesso em: 14 mar. 2024.

RASHISH, G. L. et al. Spontaneous neonatal arterial thromboembolism: infants at risk, diagnosis, treatment, and outcomes. *Blood Coagulation and Fibrinolysis*, [S. l.], v. 24, n. 8, p. 787-797, 4 maio 2013.

TROMBOEMBOLIA pulmonar tratamento. [S. l.], 2013. Disponível em: https://www.medicinanet.com.br/m/conteudos/revisoes/5952/tromboembolia_pulmonar_tratamento.htm. Acesso em: 14 mar. 2024

TSONIS, O. et al. Neonatal femoral artery thrombosis at the time of birth: a case repor. *Journal of Pediatric and Neonatal Individualized Medicine*, [S. l.], v. 9, n. 2, p. 1-5, 8 set. 2020.

OBRIGADA!

Agradecimento especial à equipe de Neonatologia do HUAP/UFF e ao
Dr. Leonardo Brandão pela ajuda na condução do caso